

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2019 (coorte 2003 - 16 anni)													
Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)													
REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
Piemonte	83,61	83,78	82,08	97,44	95,51	97,38	95,32	97,38	95,36	82,37	83,89	3,09	80,61
Valle d'Aosta	87,68	88,02	85,91	96,03	93,76	96,03	93,08	95,95	93,33	84,30	88,02	1,18	82,78
Lombardia	76,39	76,61	74,70	96,38	93,99	96,09	92,81	96,20	93,10	n.d.	75,83	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	72,79	73,43	70,58	91,04	86,58	90,78	86,27	90,87	86,27	63,17	75,92	4,81	32,90
Prov. Aut. Trento	87,27	87,71	85,86	95,29	93,90	95,29	93,41	95,29	93,55	86,72	19,97	3,80	85,66
Veneto	85,64	86,27	84,40	96,57	94,15	96,38	93,21	96,33	93,48	89,12	84,16	9,29	82,97
Friuli-Venezia Giulia	74,41	75,32	73,50	95,22	93,21	95,05	92,59	95,12	92,72	73,48	74,44	4,42	70,31
Liguria	75,32	75,77	74,45	83,44	81,58	83,42	81,28	83,44	81,74	52,75	83,99	4,02	74,79
Emilia-Romagna	90,60	90,99	88,46	96,34	93,70	96,20	92,74	96,23	93,07	92,66	97,64	8,76	91,35
Toscana	81,26	81,88	80,52	89,97	88,20	90,23	88,27	90,18	88,26	79,17	62,21	2,94	78,53
Umbria	87,73	87,85	87,89	98,00	97,14	97,82	96,87	97,93	96,99	83,87	86,34	3,51	10,25
Marche	78,64	78,81	77,79	95,94	94,14	95,78	92,34	95,79	92,34	67,00	76,68	2,56	66,94
Lazio	65,90	65,96	65,55	94,75	87,98	94,61	87,49	94,63	87,52	54,10	51,37	0,91	47,32
Abruzzo	83,05	83,06	82,86	45,90	90,67	45,90	90,68	45,91	90,68	29,61	76,41	0,86	47,47
Molise	64,39	64,39	64,39	93,69	91,79	93,69	91,79	93,69	91,79	61,70	53,79	0,82	36,66
Campania	42,93	42,96	42,55	92,21	85,09	92,19	85,01	92,21	85,06	29,01	39,59	0,62	27,69
Puglia	69,72	69,74	69,59	96,88	93,39	96,82	93,29	96,82	93,33	76,35	68,97	78,89	75,92
Basilicata	86,61	86,61	86,61	91,77	87,20	91,77	87,20	91,77	87,20	26,46	78,81	0,55	76,80
Calabria	60,49	60,49	60,49	71,66	57,87	71,66	57,96	71,66	57,87	36,93	53,21	0,35	49,96
Sicilia	49,05	49,08	48,71	96,23	86,91	96,18	86,73	96,21	87,26	47,26	49,32	0,22	45,32
Sardegna	70,81	70,82	70,49	91,11	85,37	91,04	85,22	91,07	85,28	52,46	44,59	0,52	36,53
Italia	70,87	71,09	69,98	93,10	89,62	93,01	89,12	93,03	89,28	52,42	66,68	9,57	74,92

Legenda:

(i) 5a dose

(l) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(l)
MOR 1	Morbillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillo (seconda dose)	Men ACY	Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020